

INICIO DE LA CONVERSACIÓN

Solo usted y su médico saben qué tratamiento es el adecuado para usted. Estas son algunas preguntas que puede utilizar para iniciar una conversación con su médico sobre sus opciones de tratamiento.



¿Cómo se ajustará el tratamiento a mi rutina?



¿Qué efectos secundarios podría experimentar?



¿Mi tratamiento para el VIH-1 podría afectar mi peso?



¿Puedo seguir tomando otros medicamentos junto con mi medicamento para el VIH-1?



¿Tengo que comer al momento de tomar mi medicamento para el VIH-1?



¿Existen otros riesgos para la salud que puedan ser causados por mi tratamiento para el VIH o el VIH-1?

¿Qué es PIFELTRO?

PIFELTRO es un medicamento recetado para el VIH que se usa con otros medicamentos antirretrovirales para tratar la infección por el virus de inmunodeficiencia humana-1 (VIH-1) en adultos:

- que no han recibido medicamentos para el VIH-1 en el pasado,
- o para reemplazar los medicamentos actuales para el VIH-1 en personas que cumplen con ciertos requisitos de acuerdo con el criterio de su médico.

El VIH-1 es el virus que causa el SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).

Lea la [Información para el paciente](#) de PIFELTRO® (doravirina) y analícela con su médico. También está disponible la [Información de prescripción](#) para el médico.

PifelTRO®
doravirina
Tabletas
de 100 mg

Modelos VIH positivos.



UNA CONSIDERACIÓN ADICIONAL SOBRE EL TRATAMIENTO

Mantener un peso saludable es parte importante del cuidado de tu salud y el manejo de su VIH. Es posible que tenga inquietudes sobre el cambio de peso. Si es así, hable con su médico.

Información importante de seguridad

No tome PIFELTRO si actualmente está tomando alguno de los siguientes medicamentos:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| • carbamazepina | • rifampina |
| • oxcarbazepina | • rifapentina |
| • fenobarbital | • mitotano |
| • fenitoína | • hierba de san Juan |
| • enzalutamida | |

Pregunte a su médico o farmacéutico si no está seguro de si su medicamento es uno de los que se enumeraron anteriormente. Si ha tomado alguno de los medicamentos en las 4 semanas anteriores, hable con su médico o farmacéutico antes de comenzar a tomar PIFELTRO.

La Información importante de seguridad continúa en la siguiente página.

Información importante de seguridad (continuación)

Pueden producirse cambios en su sistema inmunológico (síndrome de reconstitución inmunitaria) cuando comienza a tomar medicamentos para el VIH-1. Es posible que su sistema inmunológico se fortalezca y comience a combatir las infecciones que han estado ocultas en su cuerpo durante un largo tiempo. Informe a su médico inmediatamente si presenta algún síntoma nuevo después de comenzar a tomar el medicamento para el VIH-1.

Los efectos secundarios más frecuentes de PIFELTRO incluyen:

- náuseas
- mareos
- dolor de cabeza
- cansancio
- diarrea
- dolor de estómago (dolor abdominal)
- sueños anormales

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de PIFELTRO. Para obtener más información, consulte a su médico o farmacéutico.

Antes de comenzar el tratamiento con PIFELTRO, informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluso si está embarazada o planea quedar embarazada, o si está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si PIFELTRO puede hacerle daño a su bebé en gestación. No amamante si toma PIFELTRO. Las mujeres que tienen VIH no deben amamantar a sus bebés ya que podrían transmitirles el VIH a través de la leche materna.

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que recibe, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Algunos medicamentos interactúan con PIFELTRO.

Haga una lista de sus medicamentos y muéstresela a su médico y farmacéutico. Informe a su médico si ha tomado rifabutina en las últimas 4 semanas. **No comience a tomar un nuevo medicamento sin antes informárselo a su médico.** Su médico puede indicarle si es seguro tomar PIFELTRO con esos otros medicamentos.

Tome PIFELTRO todos los días exactamente como se lo indique su médico. Tome PIFELTRO 1 vez al día, aproximadamente a la misma todos los días.

Informe a su médico si ha tomado rifabutina en las últimas 4 semanas.

Si toma el medicamento rifabutina durante el tratamiento con PIFELTRO, tome PIFELTRO 2 veces al día, aproximadamente con 12 horas de diferencia, según lo recetado por su médico. Es posible que no tenga suficiente doravirina en la sangre si toma rifabutina durante el tratamiento con PIFELTRO.

No cambie su dosis ni deje de tomar PIFELTRO sin antes consultar a su médico. Permanezca bajo el cuidado de un su médica cuando tome PIFELTRO.

Tome PIFELTRO según el programa de administración de la dosis habitual que le indicó su médico. No omita dosis.

Si olvida tomar una dosis de PIFELTRO, tómela tan pronto como se dé cuenta. Si es casi la hora de su próxima dosis, sátese la dosis omitida y tome la siguiente dosis a la hora programada. No tome 2 dosis de PIFELTRO al mismo tiempo.

Vaya a su médico o farmacia para resurtir la receta de PIFELTRO antes de que se acabe.

Cuando su suministro de PIFELTRO empiece a acabarse, consiga más de este medicamento por medio de su médico o en la farmacia. Esto es muy importante porque la cantidad de virus en la sangre podría aumentar si suspende el medicamento, incluso por un período corto. El virus puede desarrollar resistencia a PIFELTRO y volverse más difícil de tratar.

Lea la [Información para el paciente de PIFELTRO® \(doravirina\)](#) y analícela con su médico. También está disponible la [Información de prescripción](#) para el médico.



Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA y sus afiliados.
Todos los derechos reservados. US-DOV-01227 08/23 www.pifeltro.com

Pifeltro®
doravirina
Tabletas
de 100 mg