



**Pifeltro**<sup>®</sup>  
doravirina  
Tabletas  
de 100 mg

EN MOMENTOS DE CAMBIO, ¿QUÉ LO MANTIENE ENFOCADO?

*Cantar.*

*Uso mi voz para  
animar a los demás.*

Modelo VIH positivo.

## ¿QUÉ ES PIFELTRO?

PIFELTRO es un medicamento recetado para el VIH que se usa con otros medicamentos antirretrovirales para tratar la infección por el virus de inmunodeficiencia humana-1 (VIH-1) en adultos que no han recibido medicamentos para el VIH-1 en el pasado, o para reemplazar los medicamentos actuales para el VIH-1 en personas que cumplen con ciertos requisitos de acuerdo con el criterio de su médico. El VIH-1 es el virus que causa el SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).

Este es un recurso educativo proporcionado por Merck.

Lea la [Información para el paciente](#) de PIFELTRO adjunta y analícela con su médico. También está disponible la [Información de prescripción](#) para el médico.



# ÍNDICE

CÓMO TOMAR PIFELTRO	4
OTROS MEDICAMENTOS	5
SU SALUD Y EL VIH-1	6
RESULTADOS DE ESTUDIO	7
EFFECTOS SECUNDARIOS	8
ACERCA DEL COLESTEROL	9
PREGUNTAS PARA SU MÉDICO	10

Lea la [Información para el Paciente](#) de PIFELTRO adjunta y analícela con su médico. También está disponible la [Información de prescripción](#) para el médico.

  
**Pifeltro**<sup>®</sup>  
doravirina  
Tabletas  
de 100 mg



*EN MOMENTOS DE CAMBIO, ¿QUÉ LO MANTIENE ENFOCADO?*

*Mi Comunidad.*

*Me recuerdan que  
no estoy solo en esto.*

Modelo VIH positivo.

# LISTO PARA EL CAMBIO

**E**n la vida ocurren cambios. Empezar un nuevo trabajo, desarrollar nuevas relaciones o cambios en su salud pueden hacerlo pensar en sus prioridades. Si está considerando sus opciones de tratamiento para el VIH-1, es posible que sea momento de obtener información sobre PIFELTRO.

**LA VIDA CAMBIA.  
MANTÉNGASE ENFOCADO.**

Lea la [Información para el paciente](#) de PIFELTRO adjunta y analícela con su médico. También está disponible la [Información de prescripción](#) para el médico.

## GUÍAS DE TRATAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS

Las guías del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS, por sus siglas en inglés) apoyan el cambio en los regímenes de tratamiento para el VIH por varias razones, entre ellas:



Requisitos alimenticios



Posibles interacciones con otros medicamentos



Tolerabilidad/efectos secundarios

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No tome PIFELTRO si actualmente está tomando alguno de los siguientes **medicamentos**: carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína, enzalutamida, rifampina, rifapentina, mitotano o hierba de san Juan. Pregunte a su médico o farmacéutico si no está seguro de si su medicamento es uno de los que se enumeraron anteriormente. Si ha tomado alguno de los medicamentos en las 4 semanas anteriores, hable con su médico o farmacéutico antes de comenzar a tomar PIFELTRO.

**Informe a su médico de todos los medicamentos que recibe**, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. **Algunos medicamentos interactúan con PIFELTRO.** Haga una lista de sus medicamentos y muéstrésela a su médico y farmacéutico. Informe a su médico si ha tomado rifabutina en las últimas 4 semanas. **No comience a tomar un nuevo medicamento sin antes informárselo a su médico.** Su médico puede indicarle si es seguro tomar PIFELTRO con esos otros medicamentos.

¿ESTÁ LISTO PARA UN CAMBIO?  
PREGUNTE A SU MÉDICO  
SI PIFELTRO PODRÍA SER  
ADECUADO PARA USTED.

  
**PifelTRO**<sup>®</sup>  
doravirina  
Tabletas  
de 100 mg



EN MOMENTOS DE CAMBIO, ¿QUÉ LO MANTIENE ENFOCADO?

*Bailar.*

*Siempre me lleva  
a un lugar feliz.*

**Pifeltro**  
doravirina  
Tabletas  
de 100 mg

# CÓMO TOMAR PIFELTRO

Cuando ocurre un cambio, crear hábitos puede facilitar las cosas. Usted y su médico pueden decidir si PIFELTRO podría ser adecuado para usted.



UN TABLETA  
como parte de un régimen completo



UNA VEZ AL DÍA



CON O SIN ALIMENTOS

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Tome PIFELTRO todos los días exactamente como se lo indique su médico. Tome PIFELTRO 1 vez al día, aproximadamente a la misma hora todos los días.
- Informe a su médico si ha tomado rifabutina en las últimas 4 semanas.
- Si toma el medicamento rifabutina durante el tratamiento con PIFELTRO, tome PIFELTRO 2 veces al día, aproximadamente con 12 horas de diferencia, según lo recetado por su médico. Es posible que no tenga suficiente doravirina en la sangre si toma rifabutina durante el tratamiento con PIFELTRO.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONT.)

- No cambie su dosis ni deje de tomar PIFELTRO sin antes consultar a su médico. Permanezca bajo el cuidado de un proveedor de atención médica cuando tome PIFELTRO.
- Tome PIFELTRO según el programa de administración de la dosis habitual que le indicó su médico. No omita dosis.
- Si olvida tomar una dosis de PIFELTRO, tómela tan pronto como se dé cuenta. Si es casi la hora de su próxima dosis, sátese la dosis omitida y tome la siguiente dosis a la hora programada.
- Vaya a su médico o farmacia para resurtir la receta de PIFELTRO antes de que se acabe.
- Esto es muy importante porque la cantidad de virus en la sangre podría aumentar si suspende el medicamento, incluso por un período corto. El virus puede desarrollar resistencia a PIFELTRO y volverse más difícil de tratar.

Lee la [Información para el paciente](#) de PIFELTRO adjunta y analícela con su médico. También está disponible la [Información de prescripción](#) para el médico.





Modelos VIH positivos.



Modelos VIH positivos.

## PIFELTRO Y OTROS MEDICAMENTOS

Si toma medicamentos de venta libre o medicamentos recetados para otras enfermedades, es importante que hable con su médico acerca de todos sus medicamentos.

**PIFELTRO se puede tomar junto con una amplia gama de medicamentos comunes no relacionados con el VIH-1, por ejemplo:**



### Acidez gástrica

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES  
(pantoprazol)



### Anticonceptivos

ANTICONCEPTIVOS ORALES  
(efinilestradiol y levonorgestrel)



### Dolor

METADONA



### Colesterol

ESTATINAS  
(atorvastatina)



### Diabetes

METFORMINA  
(clorhidrato de metformina)

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

**No tome PIFELTRO si actualmente está tomando alguno de los siguientes medicamentos:** carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína, enzalutamida, rifampina, rifapentina, mitotano o hierba de san Juan. Pregunte a su médico o farmacéutico si no está seguro de si su medicamento es uno de los que se enumeraron anteriormente. Si ha tomado alguno de los medicamentos en las 4 semanas anteriores, hable con su médico o farmacéutico antes de comenzar a tomar PIFELTRO.

Los efectos secundarios más frecuentes de PIFELTRO incluyen náuseas, mareos, dolor de cabeza, cansancio, diarrea, dolor de estómago (dolor abdominal) y sueños anormales.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de PIFELTRO.

Lea la [Información para el paciente](#) de PIFELTRO adjunta y analícela con su médico. También está disponible la [Información de prescripción](#) para el médico.

**Pifeltro**<sup>®</sup>  
doravirina  
Tabletas  
de 100 mg



EN MOMENTOS DE CAMBIO, ¿QUÉ LO MANTIENE ENFOCADO?

Jorge.

Él depende de mí para cuidarlo  
y mantenerlo feliz.

  
**Pifeltro**<sup>®</sup>  
doravirina  
Tabletas  
de 100 mg

Modelo VIH positivo.

## SU SALUD Y EL VIH-1

Cuando toma PIFELTRO como parte de un régimen de varias tabletas, este puede ayudarle a conseguir que su carga viral sea indetectable. Ser indetectable significa que el nivel de VIH en la sangre es tan bajo que las pruebas de laboratorio no pueden detectarlo. Y cuando su VIH está bajo control, puede enfocarse en su salud y sus metas de vida más allá del virus.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CON'T)

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que recibe, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. **Algunos medicamentos interactúan con PIFELTRO.** Haga una lista de sus medicamentos y muéstresela a su médico y farmacéutico. Informe a su médico si ha tomado rifabutina en las últimas 4 semanas. **No comience a tomar un nuevo medicamento sin antes informárselo a su médico.** Su médico puede indicarle si es seguro tomar PIFELTRO con esos otros medicamentos.

Lea la [Información para el paciente](#) de PIFELTRO adjunta y analícela con su médico. También está disponible la [Información de prescripción](#) para el médico.



## MANTENERSE INDETECTABLE ES IMPORTANTE

En un estudio de 48 semanas, un grupo de adultos que viven con VIH-1 que eran indetectables bajo su régimen de tratamiento actual cambiaron a **un régimen de una sola tableta basado en PIFELTRO** al inicio o en la semana 24 del estudio.

## MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE ESTUDIO

Los pacientes tuvieron valores indetectables (ARN del VIH-1 <50 copias/ml) durante al menos 6 meses antes de comenzar el estudio y no tenían antecedentes de resistencia\* al régimen de una sola tableta de PIFELTRO.

El régimen de tratamiento actual consistía en dos inhibidores nucleosídicos de la retrotranscriptasa (INTR) en combinación con un inhibidor de la proteasa (IP) más ritonavir o cobicistat, o elvitegravir más cobicistat, o un inhibidor no nucleosídico de la retrotranscriptasa (INNTR) antes de cambiar a un régimen de una sola tableta basado en PIFELTRO.

En el estudio, los pacientes fueron asignados al azar a uno de los dos grupos de tratamiento. Los pacientes y sus médicos que participaron en el estudio sabían a qué grupo pertenecían.

\*La resistencia ocurre cuando el virus muta y su medicamento deja de funcionar.

### AL INICIO DEL ESTUDIO:

- 447 adultos cambiaron a un régimen de una sola tableta basado en PIFELTRO.
- El 91% de esos adultos mantuvieron valores indetectables en la semana 48.

### EN LA SEMANA 24 DEL ESTUDIO:

- 209 adultos cambiaron a un régimen de una sola tableta basado en PIFELTRO.
- El 95% de esos adultos tuvieron valores indetectables en la semana 24 antes de cambiar a un régimen de una sola tableta basado en PIFELTRO.
- El 95% mantuvo valores indetectables en la semana 48.

### EN LA SEMANA 48 DEL ESTUDIO:



PIFELTRO puede no tener estos efectos en todos los adultos que viven con VIH.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CON'T)

Antes de comenzar el tratamiento con PIFELTRO, informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluso si está embarazada o planea quedar embarazada, o si está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si PIFELTRO puede hacerle daño a su bebé en gestación. No amamante si toma PIFELTRO. Las mujeres que tienen VIH no deben amamantar a sus bebés ya que podrían transmitirles el VIH a través de la leche materna.

Lea la [Información para el paciente](#) de PIFELTRO adjunta y analícela con su médico. También está disponible la [Información de prescripción](#) para el médico.



**Pifeltro**  
doravirina  
Tabletas  
de 100 mg





**Pifeltro**<sup>®</sup>  
doravirina  
Tabletas  
de 100 mg

## UNA BAJA TASA DE EFECTOS SECUNDARIOS

En un estudio de 96 semanas con adultos que nunca habían estado en un tratamiento para el VIH-1, 364 adultos recibieron un régimen de una sola tableta basado en PIFELTRO, mientras que 364 adultos recibieron un comprimido de *Atripla* una vez al día.

Fueron menos los adultos que dejaron de tomar el régimen de una sola tableta basado en PIFELTRO que los que dejaron de tomar *Atripla* debido a los efectos secundarios.

**El 97%** DE LOS ADULTOS CONTINUÓ CON EL RÉGIMEN DE UNA SOLA TABLETA BASADO EN PIFELTRO

El 3% suspendió el tratamiento debido a los efectos secundarios.

### MIENTRAS QUE

El 93% continuó con *Atripla* (EFV/FTC/TDF).

El 7% suspendió el tratamiento debido a los efectos secundarios.

En este estudio, los efectos secundarios más frecuentes de un régimen de una sola tableta de PIFELTRO fueron mareos 7%, náuseas 5% y sueños anormales 5%.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CON'T)

PIFELTRO puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

**Pueden producirse cambios en su sistema inmunológico (síndrome de reconstitución inmunitaria)** cuando comienza a tomar medicamentos para el VIH-1. Es posible que su sistema inmunológico se fortalezca y comience a combatir infecciones que han estado ocultas en su cuerpo durante un largo tiempo. Informe a su médico inmediatamente si presenta algún síntoma nuevo después de comenzar a tomar su medicamento para el VIH-1.

Los efectos secundarios más frecuentes de PIFELTRO incluyen náuseas, mareos, dolor de cabeza, cansancio, diarrea, dolor de estómago (dolor abdominal) y sueños anormales.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de PIFELTRO. Para obtener más información, consulte a su médico o farmacéutico.

Lea la [Información para el paciente](#) de PIFELTRO adjunta y analícela con su médico. También está disponible la [Información de prescripción](#) para el médico.

EN MOMENTOS DE CAMBIO, ¿QUÉ LO MANTIENE ENFOCADO?

*Mi nieta querida.  
Me recuerda lo realmente  
importante en la vida.*

Modelo VIH positivo.




# ACERCA DEL COLESTEROL

El VIH puede tener un impacto negativo en su colesterol malo (LDL-C).

En un estudio de 96 semanas con adultos que nunca habían estado en un tratamiento para el VIH-1, 320 adultos recibieron PIFELTRO como parte de un régimen de tratamiento y 311 adultos recibieron otro régimen de tratamiento\*.

PIFELTRO, como parte de un régimen de tratamiento, no aumentó el colesterol malo, mientras que el otro régimen de tratamiento\* sí lo hizo.

## EFFECTO EN EL COLESTEROL MALO (LDL-C) EN LA SEMANA 48:



\* El otro régimen de tratamiento incluyó darunavir más un refuerzo de ritonavir (PI + refuerzo de ritonavir), una vez al día.

No se ha demostrado el beneficio de estos cambios.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No tome PIFELTRO si actualmente está tomando alguno de los siguientes medicamentos: carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína, enzalutamida, rifampina, rifapentina, mitotano o hierba de san Juan. Pregunte a su médico o farmacéutico si no está seguro de si su medicamento es uno de los que se enumeraron anteriormente. Si ha tomado alguno de los medicamentos en las 4 semanas anteriores, hable con su médico o farmacéutico antes de comenzar a tomar PIFELTRO.

Lea la [Información para el paciente](#) de PIFELTRO adjunta y analícela con su médico. También está disponible la [Información de Prescripción](#) para el médico.

EN MOMENTOS DE CAMBIO, ¿QUÉ LO MANTIENE ENFOCADO?

*Mi amor.*  
*Cuando me siento ansioso, él sabe cómo alegrarme.*

Modelo VIH positivo.

**Pifeltro**<sup>®</sup>  
doravirina  
Tabletas  
de 100 mg





## UNA CONSIDERACIÓN ADICIONAL SOBRE EL TRATAMIENTO

Mantener un peso saludable es parte importante del cuidado de su salud y el manejo de su VIH. Es posible que tenga inquietudes sobre el cambio de peso.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de comenzar el tratamiento con PIFELTRO, informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluso si está embarazada o planea quedar embarazada, o si está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si PIFELTRO puede hacerle daño a su bebé en gestación. No amamante si toma PIFELTRO. Las mujeres que tienen VIH no deben amamantar a sus bebés ya que podrían transmitirles el VIH a través de la leche materna.

## INICIO DE LA CONVERSACIÓN

Solo usted y su médico saben qué tratamiento es el adecuado para usted. Estas son algunas preguntas que puede utilizar para iniciar una conversación con su médico sobre sus opciones de tratamiento.



¿Cómo se ajustará el tratamiento a mi rutina?



¿Qué efectos secundarios podría experimentar?



¿Mi tratamiento para el VIH-1 podría afectar mi peso?



¿Puedo seguir tomando otros medicamentos junto con mi medicamento para el VIH-1?



¿Tengo que comer al momento de tomar mi medicamento para el VIH-1?



¿Existen otros riesgos para la salud que puedan ser causados por mi tratamiento para el VIH o el VIH-1?



TOME UNA FOTO DE ESTAS PREGUNTAS Y ANALÍCELAS CON SU MÉDICO.



Modelo VIH positivo



**Pifeltro**  
doravirina  
Tabletas  
de 100 mg

Modelo VIH positivo.



**LA VIDA CAMBIA.  
MANTÉNGASE  
ENFOCADO.**

**PREGUNTE A SU MÉDICO  
SI PIFELTRO ES ADECUADO  
PARA USTED.**

### **AHORRE EN COSTOS DE BOLSILLO PARA PIFELTRO**

Los pacientes elegibles con seguro privado pueden ahorrar en sus costos de bolsillo con recetas que califiquen para PIFELTRO. Los ahorros se limitan a la cantidad de sus costos de bolsillo, hasta un ahorro máximo de \$6800 por paciente. No todos los pacientes son elegibles. Se aplican ciertas restricciones. Visita [PIFELTRO.com/es-us/](https://www.pifeltro.com/es-us/) para ver los Términos y condiciones.



Modelo VIH positivo.

Lea la [Información para el paciente](#) de PIFELTRO adjunta y analícela con su médico. También está disponible la [Información de prescripción](#) para el médico.

Los productos mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA y sus afiliados. Todos los derechos reservados. US-DOV-01273 10/23



**Pifeltro**<sup>®</sup>  
doravirina  
Tabletas  
de 100 mg